

## KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

AXIPIO  
Apiksaban

### Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta

**Należy zawsze mieć tę kartę przy sobie.**

**Należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego, którzy leczą pacjentów.**

**Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku AXIPIO w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.**

**Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie**

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

### Informacja dla pacjentów

- Lek AXIPIO należy przyjmować regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć tabletkę od razu, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy przerywać stosowania leku AXIPIO bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub innych powikłań.
- Lek AXIPIO pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- W czasie stosowania leku mogą wystąpić:
  - zasinienie lub wylew podskórny
  - smoliste stolce
  - krew w moczu
  - krwawienie z nosa
  - zawroty głowy, zmęczenie
  - błądź lub osłabienie
  - nagły, silny ból głowy,
  - odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli wymienione objawy nie ustępują, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**
- W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakimkolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku AXIPIO.

### Podstawowe informacje dla osób należących do fachowego personelu medycznego:

- AXIPIO (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- AXIPIO może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem AXIPIO nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) – patrz ChPL.
- Dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowane przeciw czynnikowi Xa.